

識
病
捷
法

識病捷法卷之九

蘇郡長洲慕松繆存濟纂集

下蠱門

有二名

此門與諸毒門互相查考治病

民被陰謀下蠱者百無一生人反忽之余恐士喪經商
遭不良之輩起謀財報恨之心所以開示卷之前也下
蠱毒藥無非投於飲食凡遇飲食即以犀角攪試毒之
有無則免受其毒矣

○試下蠱毒法

使病人唾涎水中沉者是不沉者非也○又試法以犀角攪飲食有白沫竦起者即為有毒無沫起者非也士庶經商須帶犀角每遇飲食即試之

下蠱初病

其症心腹切痛如有物嚙或吐血下血如爛肉狀不即治之食人五臟則死○服櫟皮散

下蠱病

吐血下血如爛肝之狀下數斗合一滿口謂之四臟悉壞唯心未毀或鼻破待死者○服岩瓢湯

水毒溪毒

五加皮在行李中

頭疼發熱等病如傷寒相似○用五加皮為末

每服二錢酒調下日服二次夜服一次

苦瓠湯

即苦瓠

用苦瓠一枚切碎以水二碗煎至一碗分二服
空心服吐下虫即愈

槲皮散

槲皮

北陰白皮

桃根白皮各四兩並切碎蝟皮灰亂

髮灰各二兩火麻子油五升先以水五碗煎槲

皮桃取濃汁二碗和麻子油每服溫一盞調蝟

皮髮灰各一錢令患人少食且服須臾用水一
盆以鷺羽在喉中攪而引生水中如牛涎諸虫
並出

諸毒門

有二十二名

凡人入山川遠行不服水土或殺畜菜菓產之有毒食之多致於危然而大聖久設救治之法正為民之枉比如忽而不習其方或一朝逢遇其毒抑如之何今述解毒方法於左少留意焉

溪江水毒

不服水土者病患如傷寒狀先服五加皮末二錢酒調下不愈再服葱白七根豈豉一握梔根升麻各一錢水一鍾半煎至七分不拘時服少

時再服一劑

誤飲蛇交水毒

或蛇交遺精在水誤飲之成形在腹食其心則用雄黃末二錢水調下

山嵐瘴氣毒

凡入山川見瘴氣雖不病亦可解毒丹一九冷水入薄荷一葉同研下

百虫毒

南方有虫毒之鄉或於他家飲食即以犀角攪之有白沫竦起即為有毒不可食或無犀角試

驗在深山及南方住久必積毒並服解毒一
丸

誤食水蛭毒

水蛭入腹日久必成小蛭食人肝血腹痛不可
忍面目黃瘦全不進食不早治必死○用田中
泥一塊以小死魚三五箇同猪膏熔油攪勻用
巴豆十粒去皮膜油入泥內研爛和丸如菽豉
大用田中冷水吞下十丸小兒三丸至五丸瀉
史瀉下小蛭却以四物湯加人參煎服

百草毒

用白扁豆曬乾為末每服三錢新汲水調下或
服解毒丹一粒

一切藥毒

用石蟹以熱水磨服或服解毒丹一粒

砒霜毒

其症煩躁如狂心腹攪痛頭旋欲吐不吐面色
青黑四肢厥冷命在須臾不救口用菴豈半升
搗去查汲水調通口服或用龍花二錢分二服
井花水調下又方治悶絕心頭溫者汲水調真
粉服之神効

附子毒

服附子多而覺頭重如斗唇裂血流或身發黃
急用黑豇豇豇各數合嚼之及濃煎黑豇豇湯
飲之或悶亂不省醋灌煎甘草湯同生姜自然
汁飲之又方螺青細研新汲水調下

色豇毒

其症口乾兩臉赤五心熱利不止諸藥不効用
芭蕉根葉研取自然汁服利止而安

班猫荒青毒

用大小黑豇煎濃汁服之並瘥或服解毒丹一

粒

金石毒

即五金五石

用黑鉛一觔以乾鍋內作汁投酒一升如此數遍候酒煎至半升去鉛頓服之効或服解毒丹一粒

一切穀肉菓菜毒

用菰豈一升濃煮汁連豈飲食之凡大小人家合醬以菰豈為之尤妙

麵毒

食蘿服解之

疫死禽獸毒

凡食自死肉疫死肉即服解毒丹一粒

禽獸肝毒

凡物肝臟不可輕食食之中毒用豇豉以水浸絞取汁旋服之

犬肉毒

凡犬有毒食之不消心下堅或腹脹口乾大渴心急發熱狂言或洞下服杏仁一升去皮尖研以百沸湯三升和絞汁作三服犬肉原片皆出

河豚毒

用五倍子白礬各等分為細末水調下不愈再服解毒丹一粒

鉤吻毒

面青口禁逆冷身痺欲死者有云鉤吻菜更食芥相似而所生之傍無他草其莖有毛誤食之殺人用薄桂煮汁飲之不愈再服解毒丹一粒

蛇傷毒

用青黛雄黃等分為末水調服磨解毒丹涂臍犬咬毒

方見急救門更服解毒丹一粒冷水磨塗患處

湯火毒

方見急救門更用解毒丹一粒流水磨塗傷處
解毒丹

凡人居家出入不可無此藥真濟世衛家之寶
除解已上之毒更治十五門病症○五倍子三
兩淡紅黃色者搥碎洗淨山茨菰二兩續隨子
一兩去穀研細以紙裹壓去油紅牙大戟一兩
半淨洗射香三分右研為細末糯米粥為劑每
料分作四十粒端午重陽七夕脩合用辰日杵
千下勿令婦人雞犬孝子見

治外科癰疽發背魚臍瘡未破之時用一粒水磨塗痛處并磨服之覺痒立消

治傷寒科陰陽二毒心悶狂言胸膈壅滯邪毒未發及瘟疫用一粒薄苛一葉同研水送下

治咽喉科纏喉風用一粒服法同前

治牙齒科牙疼用一粒酒磨塗患處及含藥少許吞下

治小兒科急慢驚風五疳入痢用一粒蜜水薄苛一葉同研下牙間緊急水磨一粒塗於牙間

治女科鬼胎鬼氣並用無灰酒磨下一粒

治眼科赤眼水磨一粒服之

治中風門諸般癰症口眼喎斜目掣眨夜多瞤涎
言語蹇澁卒中風口禁牙關緊急絞縮骨節風
腫手足疼痛行步艱難一應風氣痛並用酒磨
下孕婦不服

治急救門縊死落水死心頭暖者驚死未隔宿者
並用冷水磨灌藥一粒

治神鬼病門急中顛邪喝呌狂走用無灰酒磨下
一粒

治頭疼門年深日近頭痛太陽疼用酒入薄荷葉

磨濕紙花貼太陽穴

治瘡疾門諸般瘡疾不問新久臨發時煎桃柳枝湯磨下一粒

治損傷門從高墮下跌撲打傷墻屋倒壓炒松節煎無灰酒磨服一粒并塗傷處

治黃疸門諸疸並用酒磨服一粒

治癆瘵門磨一粒服下二時癆吐下

四物湯見虛損門

咽喉門

有十七名

附骨頰

此門與舌口門互相查考治病

喉之腫脹古名喉痺痺者不仁也君火相火土之
噬乾噬痛咽腫頰腫舌強皆心火為病惟喉痺急
速二焦相火所為也咽喉舌病同於火故不分耳
熱上行傳於喉之兩傍近外腫作以其形狀似乳
蛾故名曰蛾初發一邊腫為單乳蛾兩邊腫為雙
乳蛾比蛾差小者為單閉喉雙閉喉熱結於舌下
生一小舌名子舌腫熱結於舌中其舌腫大各本

舌腫熱結於咽喉腫透於外且麻且痒腫而大者
名纏喉風走馬喉痺其症生死在於反掌用針出
血最爲上策也

○治法

凡喉症用藥吹喉間涼藥灌鼻中拔毒藥敷外
種處藥水灑患處百餘遍服牛旁子散

凡喉症不用刀針法用小口瓶內燒蛇床子煙
張口受煙一薰即破

凡喉症用止痛法生薄苛研蜜調成膏送入喉
立効如延多未退再用之即以葱頭兩箇搥

碎安牙牀頭處立開

凡一切喉症服牛旁子玄參升麻桔梗犀角木通黃芩甘草各等分水煎服

凡一切喉症吹喉藥用枯礬參錢銅綠五分為細末以蘆管吹入少許喉中即將筋咬齒上垂頭放出痰涎一日吹數次在無風處吹之吹時以筋壓舌○又方用烏梅肉包胆礬稀薄布裹含之

凡喉症用陽起石伏龍肝各等分新汲水調灑患處百次

單乳蛾

用如聖金錠子

雙乳蛾

用神仙奪命丹

纏喉風

用拔毒雄黃散

走馬喉痺

勢如奔馬腫痛煩滿數七吐氣○服橘皮湯

單喉閉

用七保散

雙喉閉

用紫苑方

重舌

用皂角刺煨朴硝少許研勻先蘸藥水擦口內
并舌上下隨將藥末搽舌上下 出即消

木舌

半夏醋煎漱口吐出藥不時嗽之以瘥為度

傷寒邪熱為喉痺

用半夏湯

時毒為纏喉風

服普濟消毒散

氣逆為痰痺

服射干湯

痰飲為喉痺

服射干湯

冬月咽喉不利語聲不出

用玉粉丸

壯實人咽喉疼痛

服防風散虛人少用

喉症牙關緊閉

木膏

益母草

人參

白朮

桃仁

陳皮

黃芪

茯苓

甘草

猪羊胞入藥共

煎服之

天門冬飲子

天門冬

知母

芫薺子

五味

防風

茯苓

菴活

人參各等

水二碗薑三片

煎八分食後服

生熟飲子

草肉豆蔻

草果

厚朴

半夏

甘草

大棗

生姜

各等分

水二

鍾煎八分食前服

草果飲子

草果

半夏

川芎

赤茯苓

陳皮

白芷

水煎服

全生方

白朮

姜皮

大腹皮

茯苓皮

陳皮

為末每服二錢米飲調下

探吐法

此法治胞轉服參朮飲以指探喉中吐出藥汁

及腫處然後以溫水灌漱如咽喉間毒已破瘡

口痛者用猪腦髓蒸熱淡薑醋蘸喫之立効

七保散

治咽喉風及

殭蚕

十箇

蓬砂

一錢

雄黃

一錢

全蠍

十箇

明礬

膽礬

五分

皂角

一小錢

右為細末每服一字吹入

喉中即愈

清心利膈湯

防風

荊芥

薄荷

桔梗

黃芩

黃連

各一錢半

山梔

連翹

各一錢

玄參

大黃

朴硝

牛旁子

甘草

各七

右作一服用水

諸病... 三

二鍾煎至一鍾食遠服

用巴荳法

以巴荳去殼以紙包巴荳內用竹管壓出巴荳
油在紙上將油紙作燃點燈吹滅以烟熏左右
鼻孔中口鼻涎流牙關開矣

甘桔湯治風痰上壅咽喉腫痛吞吐如有碍

桔梗兩一 甘草兩半 右作一服水一鍾煎至一

鍾食遠服

橘皮湯治馬猴勢如奔馬喘痛煩滿數吐氣

橘紅 竹茹 生地 山梔 白朮

黃芩

各二兩

官桂

一兩

赤茯苓

二兩

右剉碎每服

三錢水一鍾生薑一片紅棗二枚煎五分去查

下芒硝末一錢食後溫服一日三次

神仙奪命丹

治纏喉風木舌脹乳驚喉閉或誤吞雞魚骨刺竹木刺一切咽喉急症

烏賊骨

二錢半

射香

一字

白茯苓

蜜陀僧炒

白殭蚕

貫衆

縮砂仁

紫河車

甘草

各一兩

右為末研勻用蒸餅包白麴蒸熟

四兩和藥汲井水丸如豌豆大蛤粉為衣放乾

處十年不壞每服一丸以瓦罍研碎水半盞浸

一茶時化開用匙挑藥滴入喉中

射干湯

治喉痺腫塞不通疼痛不下飲食并諸毒發動

射干

白芷

當歸

杏仁

升麻

犀角

甘草

各半兩

每服三錢水一盞煎七分

去滓不拘時溫服日三次

如聖金錠子

硫黃

川芎

川烏

薄荷

硝石

芽茶

生地

各等分

右為末以生葱汁搜和為

錠每服先將新汲水灌軟吐出次嚼薄荷五七

葉微爛用一錠同嚼極爛以井水嚥下甚者連

進三服即愈重舌腮腫先服一錠次以一錠安

患處便消胃暑伏熱不省人事用薄荷水調研一錠灌下即甦行路常噙一錠即無暑熱之患金鎖匙

鬱金

大黃

草烏

猪牙皂角

去皮

南星

各四錢

巴豆

五箇去油

右為末用生薑自然汁調

五分許以鷄翎拂入喉中已死者用竹管吹入

須臾醒然後用藥半錢以調食之其吐瀉為驗

一字散

雄黃

一分

蠟

七枚

猪牙皂角

七箇

白礬

二錢

藜蘆

二錢

右為末每用一字吹入鼻中即時吐出頑涎即

愈一方無蠟稍亦治時氣纏喉風累用救人萬
無一失

一捻金散

地龍八錢射香少

全蝎炒

僵蚕炒

麝金

甘草

右為細末每用一匙吹入喉內舌根

不數吹愈

雄黃散

雄黃

乾桑

黃茹片

巴豆

生熟 鬱金

研勻用半匙清茶下如口禁咽塞用小管納藥
吹入喉中須臾吐利即愈一方無乾桑黃茹

奪命散

治急喉風等症

白礬

蓬砂

皂角

各等分

右為末每用少

許吹喉中痰出即愈

治咽喉不得針者

用蛇床子入在小口瓶內燒烟患者張口受烟

一熏即破

潤開佳痛方

以生薄苛研蜜調成膏送入咽喉下立効如涎多未退再服一方用葱頭兩箇搥研空牙牀頭處立開

紫苑方

治繩喉風閉飲
食不通欲死者

用返魂草根一莖即紫苑納入喉中待取惡涎
出即可如患乳鵝刺破後更以紫苑濃煎湯漱
下更以馬牙硝末挑一錢入咽間即愈一名紫
苑又南中呼為夜牽干是也

治一切咽頰腫毒

右以蟬殼為末猪膽汁和蜜調傳腫處

拔毒藥

普濟消毒散

半夏湯

牛旁子散

拔毒雄黃散

防風湯

不用刀針法

巴豆法

已上湯開末卷

咳逆門

有十名

咳逆之聲連續不絕有數声起至四五十聲而止者氣自臍下衝上出於口而作聲之鳴也俗名吃忒咳逆不順之義吃忒差錯之義二者皆氣不得下為火熱托之而使上至咽喉中噎而止也古人悉以胃弱言之而不言火熱况人之陰氣依胃為養胃土損傷木氣則侮此土敗木賊也陰為人所乘不得內守木挾相火乘之故直衝清道而上為之咳逆言胃弱者即陰弱乃虛之甚也大抵傷寒

後大病後老人虛人產婦多有此症皆病深之候

○不治脉

肺部脉散

○難治症

病後咳逆

○治法

凡咳逆有餘并痰者吐之用人參蘆之類不足者人參白朮下大補丸

凡咳逆以撚帛條入鼻作嚏而止或詐冤賊盜因恐而止或鼻聞香食熱而止此三法謂抑

之駭之使氣下而愈

凡治咳逆服藥無効用硫黃嗅法不愈再用雄黃嗅法

凡咳逆氣虛用人參白朮

凡咳逆寒熱或因汗吐下誤服涼藥宜溫補之

凡咳逆挾熱者宜涼之

凡咳逆脾胃虛火逆上宜平補之

凡咳逆如傷寒失下宜下之

凡咳逆痰蓄暴怒別無他病宜吐下之

凡咳逆陰火炎上用黃連黃柏滑石

寒咳逆

或胃中有寒為咳逆○服

寒熱咳逆

傷寒熱症咳逆嘔噦○服小柴胡湯加柿蒂

傷寒咳逆

傷寒咳逆日夜不止○服華澄茄散

飲咳逆

或嚥飲錯喉而氣搶為咳逆○服五苓散加橘

皮枳殼

食咳逆

或急食乾物而氣塞為咳逆○服五苓散加枳
柳桔梗

笑咳逆

或喜笑多而氣噎為咳逆○服橘皮枳殼

水咳逆

或水漬於肺心下痞連續不已○服五苓散加
枳實桔梗蒼朮白朮

吐利後咳逆

或吐利後胃虛為咳逆○服橘皮竹茹湯

大病後咳逆

大病後脾胃虛寒咳逆七八聲相連收氣不回
難治○服丁香柿蒂散

咳逆大便閉

服大承氣湯

橘皮竹茹湯

橘皮

錢二

竹茹

錢二

人參

錢二

甘草

作一服

水二鍾薑五片紅棗三枚煎八分不拘時服

半夏生薑湯

半夏

六錢

生薑

五錢

作一服水二鍾薑五片煎

一鍾不拘時服

丁香柿蒂散

丁香 柿蒂 人參 茯苓 橘皮 良薑炒

半夏 生薑特分為末每服三錢水一盞煎服

治寒氣攻胃咳噫

用黑豆二合炒熱入於瓶中以熱醋沃之紙封固上開一小孔令患人以口吸其氣入咽喉中其咳即定

葶澄茄散

葶澄茄 良薑各二兩右為末每服二錢水一盞

煎六分沸投醋半盞取出呷之

硫黃嗅法

硫黃

乳香

各等分

為末用酒煎急令患人嗅之

又方嗅法

雄黃二錢

為末用酒一盞煎七分急令患人嗅

其熱氣即止

大承氣湯

小柴胡湯

見脾胃門

見傷寒門

大補丸

五苓散

見虛損門

見濕門

厥逆門

有十二名

厥逆兩說而手足冷者謂之厥四肢不溫者謂之逆由臟氣相刑或與外邪相忤則氣不行氣不行閉於經絡諸脉伏匿昏不知人陽氣衰於下為寒厥陰氣衰於下為熱厥陰氣盛於上為尸厥氣血相搏血氣入於臟腑為卒厥又曰氣厥

○總脉

沉微為寒厥	沉數為熱厥	脉細為氣厥
脉虛為血厥	浮滑為痰厥	

○死症

唇口青死

身冷者死

○治法

凡治厥逆降心火益腎水通血脉調氣

凡治厥逆先用瓜蒂散吐之

凡治厥逆遇口噤用搐鼻法

凡形氣稍實者先用瓜蒂散

凡治厥形氣虛者兼用調理

凡治不問何厥先灌蘇合香丸醒後隨證用藥

寒厥

手足冷初得之時四肢冷脉沉微不數多惡寒引衣自覆下利清穀外多惺惺○服四逆湯熱厥

手足熱初得之時必發熱頭疼脉沉伏數畏熱喜冷揚手掉足煩躁不眠大小便閉赤外症多昏冒○服白虎湯

尸厥

其症暴不知人或至半日遠一日復又識人○服追魂湯

卒厥

卒厥為形實七情痰飲內鬱而厥必半日一二
時間愈形虛而氣逆甚者多不救○服追魂湯
氣血為厥

雜病吐衄血而厥不知人者一二日或兩三日
則愈陰氣上實身不熱熱則不厥厥則為血溫
身熱○氣虛用四君子湯血虛用四物湯

卒暴厥

不知人未辯風痰氣寒熱○用蘇合香丸之
醒後辯症服藥

風厥

手足搐搦○治宜解散藥加薑汁

痰厥

涎潮如拽鋸聲在咽中○用竹瀝白朮為主

氣厥

暴氣而厥○用八味順氣散

酒厥

因酒而得○治宜發汗利小便補胃氣

胃厥

喘而強直○用馬薊苓枳殼半夏陳皮姜汁竹

瀝黃柏橘紅甘草

骨厥

骨枯爪痛○用黃柏熟地玄參地骨皮當歸枳殼花粉貝母

四君子湯

四物湯

見脾胃門

見諸血門

瓜蒂散

搐鼻法

蘇合香丸

四逆湯

白虎湯

八味順氣散

追魂湯

已上湯名見九卷

破傷風門

有八名

外科金瘡科必與此門並用

破傷風病與傷寒症同治須分虛實陰陽表裏半表半裏宜汗宜下宜和解及分傷輕傷重因諸瘡出膿血過多外入風邪或瘡口早閉瘀血凝內或灸毒瘡火熱鬱內即生熱也熱則生風傳播經絡寒熱更作身體反張口噤不開甚者邪氣入臟與中風相似但中風之人尚可淹延歲月破傷風病治之少緩不救也亦有瘡口袒露不避風寒而成

破傷風症或瘡口十分安妥而忽患破傷風病皆由內之氣血兩虛而在鬱熱未散所以遲發之也
內氣壯實而無鬱熱者雖破傷之無是患也

○總脉

表脉浮而無力膀胱主之用發汗藥
裏脉長而有力胃家主之用利下藥
半表裏脉浮弦小膽主之用和解藥

○治法

凡破傷風宜除風散結氣如寒藥下後以退風
熱開結滯藥調之熱退結氣散風自愈矣

凡治破傷風宜按摩導引及以物幹開勿令口
禁使粥藥可進也

凡破傷風大便不通小便赤或汗不止承氣湯
速下之

凡破傷風脉沉在裡用承氣湯下之

凡背後搐者用羌活獨活防風甘草

凡胸前搐者升麻白芷獨活防風甘草

凡兩邊搐者柴胡防風甘草右搐加滑石

凡治破傷風如治傷寒發熱用麻黃桂枝加黃

芩石膏知母之類是也

發表藥

用羌活防風湯

攻裏藥

用大芎黃湯

半表半裏藥

用地榆防風散

風入瘡口

項背強牙關緊急欲死○服防風散又方用蜈蚣為末擦牙吐出涎沫立愈

破傷風

驚搐臟腑閉澁病在裏可用此藥下之○服江
鰮丸

治發表藥過有自汗

服白朮防黃湯

治破傷風大汗不止筋攣搐

服白朮湯

治病日久氣血漸虛邪氣入胃養血

眼養血當歸地黃散

白朮防黃湯

白朮

黃芪各一兩

防風二兩

分作三服每服

用水二鍾煎至一鍾溫服

大芎黃湯

川芎

羌活

黃芩

大黃各一分四

服每服用水二鍾煎至一鍾溫服

白朮湯

白朮

兩

葛根

兩

升麻

黃芩

各五錢

芍藥

甘草

各三錢

分作四服每服用水二鍾

羌活防風湯

羌活

防風

川芎

藁本

當歸

芍藥

甘草

各二錢

地榆

細辛

各一分

分作

二服每服水二鍾煎八分熱服若大便閉加大黃

防風散

防風

天南星

炮

各等分為末每服童便

一大盞煎七分熱服

地榆防風散

地榆

防風

燈草

馬齒莧

各等分為

末每服三錢溫米湯調服

養血當歸地黃散

當歸

酒洗

地黃

芍藥

川芎

各一兩

藁本

防風

白芷

各五錢

細辛

錢半

分作六服水二

鍾煎至八分服

江鰮丸

江鰮

燒半兩

野鴿糞

炒半兩

雄黃

錢一

白殭蚕

錢四

蜈蚣

天麻

兩一

右為細末飯研為丸如梧桐子大朱

砂為衣巴豆霜一錢入前藥內每服十九空心

白湯下以利為度如不利仍前藥服如利則止

遺精門

有十名

精者人身之本生氣之源髓之化也腎受五臟六腑之精而藏之故曰腎藏精心為主宰其病雖在腎責本在乎心心主神神有所思動則神馳不返由是君火失令相火失守下焦不能制藏真精真精自漏不待交感而夢中遺泄也豈非心腎不交之致乎又有不因夢中遺泄而出者名曰精滑精滑當固其真遺精當治其心此則謂治其本也

○總脉

脉弦大男遺精女漏下

○治法

凡遺精用青黛龍骨黃柏為主藥
遺精

服百補交精丸

精滑不禁

服鎖精丸或固真散

睡去即遺精

服固真散

陰虛火動遺精

服十味地黄丸

方見注

精滿遺精

不須服藥

晝所思見夜即遺精

不須服藥全要正心誠意

內傷遺精

內傷氣血不能固守精遺者○用八珍湯加牡

蠣火煅存性

用心過度心不能攝腎遺精

用十味地黄丸

方見注

大便閉結夢遺者

用鎖陽煮粥食之

大便澹而夢遺者

用牡蠣醋煨醋丸服之

固真散

白龍骨

兩

韭菜子

合

為細末每服二錢空心酒

調服

鎖精丸

獨活

續斷

穀精草

石蓮肉

菱米

金櫻子

白茯苓

川練子

炒醋

小茴香

藕節

生芡實

蓮蕊

龍骨

各等分

右為末鷄子清

丸如梧桐子大每服四十五丸空心鹽湯送下

以乾物壓之

百補交精丸

熟地

四兩

山藥

二兩

五味子

一兩

杜仲

三兩

牛膝

二兩

肉蓯蓉

二兩

澤瀉

炒

山茱萸

茯神

遠志

巴戟

去心

石膏

栢子仁

赤石脂

略二

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十丸空心

用酒送下

八珍湯

四君子湯

見諸血諸氣門

合四物

門

白濁門

有八名

白濁又名白淫由腎水不足不能升運膀胱之火凝結自敗故小便澀而成濁又曰胃中痰積流下糝入膀胱而有赤白之分赤濁為心腎有熱思慮而得之白濁為腎虛有寒嗜慾而得之其狀如油或如膏或有五色光彩或多或久不愈令人虛損成癆也

○易治脉

遲

○難治脉

尺部脉虛浮急

○治法

凡白濁宜燥濕降火甚者上用吐法以提其氣
下用二陳湯加蒼朮白朮赤濁濕傷血加白
芍藥黃柏青黛滑石蛤粉神麴糊丸服

赤濁

服遠志丸

小陸二仙丹

白濁

服鹿茸益精丸

白濁出如骨髓

服大茴香丸

肥人白濁

用半夏神麴共以酒洗苓各等分為末姜汁糊為

丸服

瘦人白濁

用黃栢滑石椿木人川芎黃連滑加龍骨石脂血

虛加四物湯

虛勞人白濁

用補陰藥大槩不宜寒涼胃虛弱者加白朮

小便不清

服便濁方

精氣不固白濁

用茯苓一觔去皮切作塊用水二碗煎乾取出
晒乾為末爭篩四兩黃蠟四兩將蠟溶化入茯
苓末丸如彈子大空心細嚼一丸滿口生津慢
慢燕下服之小便清為度忌食醋

四物湯

川芎

當歸

芍藥

熟地

二陳湯

半夏

廣陳皮

水二鍾薑三片煎服

大茴香丸

大茴香

酸棗仁

炒

破故紙

炒

白朮

杜蠟

益智

人參

各等分

為末用青鹽酒糊丸如梧

桐子大每服二十丸食前米湯送下

遠志丸

遠志

半斤

茯神

益智

各二兩

為末酒糊為丸

如梧桐子大每服五十丸白滾湯送下

鹿茸益精丸

鹿茸

桑螵蛸

肉蓯蓉

杜仲

巴戟

兔絲子

益智仁

川練子

禹餘糧

當歸

已上各

非子抄

破故紙

山茱萸

龍骨

赤石脂

各

乳香

二錢

為末糯米糊丸如梧桐子

大每服四十丸食前白滾湯送下病愈即止藥

小六二仙丹

龍骨

一兩

砂仁

半

訶藜勒

五

丹砂

五

為末

煮糯米糊丸如綠豆大以硃砂為衣每服十丸

空心酒送下臨卧五丸冷水送下倘大便不通

用葱煎湯濃茶各半服之

便濁方

生礬

二錢

研細用

猪油

熬熱入

童便

小

盆煎

一沸

入礬

在內

調勻

食前服

汗門

有七名

汗者心之液陽熱入陰血散於外而為汗也盜汗
睡中而出自汗亦非睡去又不因發汗行坐之間
而汗自出也盜汗自汗其出雖異其液一也又曰
陽蒸陽分而液出為自汗陽蒸陰分而液出為盜
汗內分陰陽之偏勝外分腠理之疎密內緣心腎
俱虛外為肺氣不足明此理而治之其効甚速也
○死症

傷濕額上汗因下微喘者死

○禁食

桃子 李子 杏子 雀肉 辛辣 麪

止一切汗法

麻黃根蘖本白芷牡蠣煨龍骨腦子各五錢
米粉二兩右為細末以細紗包藥汗處撲敷
之汗止為度

○治法

凡自汗用人參黃芪少佐桂枝虛者少加附子
以行參芪之功

凡汗無用痰熱藥少許

凡火氣上蒸胃中之濕作汗者用涼膈散

盜汗

用當歸六黃湯外用止汗法見前治

自汗

用牡蠣散外用撲法見前治

傷風傷寒有汗

見傷寒門

濕勝自汗

用調衛湯

飲食汗出

用調衛湯

別處無汗獨心孔一片有汗

用艾煎湯調茯苓末服之

頭額汗

陰陽俱虛枯燥亡津液○熱入血室頭汗○胃

上蒸熱額汗○發黃頭汗○服大補黃芪湯

當歸六黃湯

當歸黃連黃柏黃芩生熟地各等分黃芪倍加

水二鍾浮麥一撮煎服

牡蠣散

麻黃根

牡蠣各二錢

黃芪三錢

浮麥三錢水煎服

大補黃芪湯

黃芪

黃芩

防風

山茱萸

當歸

白朮

甘草

茯苓

熟地

浮麥

各一錢水二鍾半煎一鍾服過一貼去防風再煎一二貼汗止為度

調衛湯

麻黃根

黃芪

各一錢

羌活

七分

甘草

當歸

黃芩

半夏

各五分

蘇木

紅花

各一分

五味

麥門冬

生地

各三分

猪苓

二分

水煎服

涼膈散

連翹

梔子

黃芩

薄荷

甘草

大黃

朴硝

等分

水二鍾薑三片燈心煎服

班疹門

有十二名

班疹皆毒氣并血熱蘊蓄於命門遇相火合起則發隱隱發於皮膚之間故言隱疹發則或痒或不仁班屬三焦相火疹屬心火班亦有屬風熱而作者疹亦有屬肺熱而作者但陰陽不同有傷寒不當下而反下之熱邪乘虛而入發班者有傷寒當下反不與下之胃熱不得泄而成班者有陰症傷寒發班有時氣發班有熱病發班有溫毒發班有內傷發班其班如錦紋或發面部或發胸背或發

四肢治斯疾者全要眼到心到庶無差矣

○驗看班疹法

用紅紙撚条淬油點火照面部至四肢胸背皮裡肉外有色點無頭粒者名曰班有頭粒浮皮上隨起即沒沒而又出有小紅壓行皮膚之中名曰疹○班色赤者胃熱班色紫黑胃爛○陰症班發在胸背并手足但稀少微紅如蚊蚤虱咬狀而非錦紋

○不治症

發斑兼身熱

陽毒發班如錦舌捲狂

七日不治

○死症

斑色紫黑死 陰症發斑作熱治者死

○治法

凡斑疹用通聖散中消息當微汗以散之不阿
凡斑疹有胃熱助心火傷肺故紅點如斑生皮
毛間白虎湯瀉心湯從長用之

凡斑疹因外感熱症用玄參升麻湯白虎湯類
凡發斑疹若自吐自瀉者謂邪氣上下皆出主
多吉切不可妄治

凡斑疹首尾俱不可大下大抵宜用安表藥六

分發散藥四分

凡斑疹病大便閉者微吐疎利之不可大下
陰症發班

班出胸背并手足稀少微紅如蚊蚤虱咬狀非
若錦紋○服大建中湯

內傷外感陰班

先有內傷症後又有外感病故發陰班○服調
中湯

傷寒發班

詳見傷寒門或以玄參升麻湯白虎湯治亦効

疹

熱與痰在肺治服清肺火降痰解微汗之

內傷發班

因胃氣虛極一身之火遊於外以致發班治宜
補以降之

班疹

有胃熱助心火傷肺見紅點如班生皮毛間○
白虎湯瀉心湯從長用之

外感熱症發班

用玄參升麻湯白虎湯等藥

時毒發斑

脉絃洪在半表裏者○服中和湯

時毒瘡疹

發於頭面胸膈之際脉浮洪○服升麻牛旁散

四時癰疹

四季時氣傳肌膚發癰疹增寒壯熱○羌活散

陽毒發斑

狂妄言面赤咽痛下利吐膿血陽毒者內外結

熱舌捲黑如烟煤斑如錦○服陽毒升麻湯

治斑癰疹

服消毒犀角飲以犀角磨五分入藥中

陽毒升麻湯

升麻

犀角

射香

黃芩

人參

甘草

各二錢半

右水二鍾半煎至八分先飲半鍾刻

許再進半鍾溫覆手足出汗得解

調中湯

蒼朮

半錢

陳皮

錢一

砂仁

炒

藿香

芍藥

甘草

炙

桔梗

半夏

白芷

羌活

枳殼

川芎

麻黃

桂枝

各五

薑三

片水煎服

玄參升麻湯

玄參

升麻

甘草

水煎服

消毒犀角飲

牛旁子

六荆芥

防風

甘草

水煎服

羌活散

羌活

前胡

人參

桔梗

甘草

枳殼

川芎

天麻

茯苓

蟬蛻

薄荷

各半錢

右為粗末每服五錢薑三片水煎服

升麻牛旁湯

升麻

牛旁子

甘草

桔梗

葛根

玄參

麻黃

連翹

各一錢水煎服

中和湯

荊草

菖蒲

牛旁子

羌活

川芎

防風

甘草

麥門冬

前胡

水煎服

白虎湯

知母

錢半

石膏

錢五

甘草

分七

粳米

一撮

水二鍾

薑一片煎八分溫服

大建中湯

見九卷

瀉心湯

見九卷

眩運門

有一十八名

眩運分之為二雖曰痰與火未嘗不由腎虛兼風邪所得痰本流動之物又因火動兩動相搏則為旋轉如頭旋目眩卒然惡心欲吐眼花視物不的如屋旋轉起則運倒皆由勞傷精血腎氣不能歸元而諸氣逆上是為頭目眩運也醫者審察內傷外感分別標本盛衰用藥治之

○總脉

脉浮為風

脉緊為寒

脉數為熱

脉細為濕

脉實為痰

脉大為虛

脉瀦為死血

○治法

凡眩運屬痰多無痰不能作運雖風者亦必有痰

凡眩運火動其痰用二陳湯加黃芩蒼朮菴活
凡眩運挾氣虛亦治痰為主兼補氣降火藥白
朮半夏黃芩天麻之類

凡眩運因失血多者用芎歸湯

凡眩運壯實氣實人用大黃為末茶下

凡眩運用滾痰丸治痰火

凡眩運用瓜蒂散治痰厥

風寒入腦眩運

用三五七散

風痰氣散眩運

用去風飲子

風痰攻心治心神煩亂眩運

用漢防己散

傷風眩運

先服吐藥後服愈風餅子

惡風自汗眩運

用川芎散

感寒濕頭重眩運

用芎朮除眩湯

冒雨閉濕眩運

用芎朮湯

陰陽不升病篤眩運

用增損黑錫丹

邪氣鼓作時或旋轉眩運

用天麻羌活丸

耳鳴耳聾眩運

用沉香磁石丸

目昏面浮腫眩運

用菊花散

血崩產後眩運

用芎歸湯

腦皮腫痺眩運

用紅花浸酒方

金瘡吐衄眩運

用芎歸湯

七情內傷眩暈

用半夏湯

舉頭似屋轉眩暈

用大芎辛湯

覺屋俱轉目閉不開

用人參湯

酒醉行房眩暈

川芎散

山茱萸 甘菊花

人參

川芎

山藥

茯神

各一兩

右為末每服二錢酒調下

三五七散

天雄

炮去皮

細辛

各三兩

乾姜

炮

山茱萸

各五兩

右為末每服二錢酒調下

芎朮湯

川芎

半夏

白朮

各一兩

甘草

炙五兩

右作七服每服水一鍾半薑七片煎至七分服

半夏湯

大半夏

湯七次

右每服四錢水一鍾半薑十片煎

至七分磨入沉香水一呷溫服

芎歸湯

治一切失血
脈運不絕

芎藭

當歸

酒洗各二錢半

右水一鍾半煎七分服

芎朮除眩湯

方見溫門

漢防已散

漢防已

麥門冬

前胡

各一兩

半夏

旋覆花

防風

細辛

甘草

各五錢

人參

赤茯苓

芎藭

枳實

羚羊角

荆芥

各三錢

右每

服三錢水一鍾生薑三片煎至六分不拘時服

去風飲子

防風

人參

橘紅各二兩

白朮

茯苓

各三兩

生薑兩四

以水十升煮取二升去查

分四服一日服盡

增損黑錫丹

胡蘆巴

官桂

茴香各一兩

青皮

川練

陽起石

木香

沉香各五錢

烏藥

礞石

右為末酒煮糊和丸如桐子大每服七十

丸湯送下

菊花散

菊花

旋覆花

牛旁子

羌活

獨活

甘草各半 右每服五錢水二鍾生薑三片煎八

分食遠服

人參湯

人參 白朮 當歸 麥門冬 防風

官桂略一 獨活 黃芪 芍藥各半 右每

服五錢水一盞半煎至八分食前溫服

人參神妙散

人參 煅硝 雄黃 蒼耳 川芎

薄荷 藜蘆 天竹黃 右為細末口含

水鼻中搐一匙神驗

愈風餅子

厚芎

白芷

防風

甘菊

細辛

羌活

天麻

荊芥穗

薄荷

甘草

各一兩

川烏半兩

右為末湯浸蒸餅和作餅

手每服五餅食後嚼碎茶清送下

天麻羌活丸

天麻

羌活

白芷

骨本

芎藭

芍藥

細辛

麻黃

各二兩

牛黃

射香

各一

右為末煉蜜和丸如皂角子大每服一二

丸不拘時服薄荷湯下

二陳湯

沉香磁石丸

大弓辛湯

紅花浸酒方

炮製藥品便覽

○草木花卉部

人參

如人形色黃潤照見

黃芪

皮黃肉白味甘佳外

甘草

通明結實去芦蒸用

乾山藥

科生用內科去黑皮形

茯苓

去皮紅筋

茯神

去皮去紅筋不損目

陳皮

廣東皮薄

白朮

煖胃砂用其

白扁豆

微炒

芡實

去壳生

蒼朮

米泔浸炒

沙參

去芦須

玄參

用蒲草重重相隔蒸

苦參

酒拌

丹參

貝母

灰中炮黃如用

知母 酒散炒勿犯鐵器

黃柏 木上用酒炒中用蜜

黃連 酒炒上行頭目姜汁

胡黃連 裏黑折之聖如煙

片黃芩 上中枯者名片

條芩 堅實細者各條

天門冬 水洗去

麥門冬 水洗去心煩心

生地黄 酒洗不

熟地黄 酒洗不

當歸 酒先

白芷 水洗不

川芎 形塊重上結實微大而成片者乃西芎不入藥

芎藭 形小者

藁本 去大

白芍藥 或生用或平

桔梗 去芦及兩傍肉

烏藥 去土刮

厚朴 色紫形實

山梔

去壳姜汁拌炒形大者名伏尸不用

青皮

凡用去穢夫皮同炒

枳殼

凡用去穢麩皮同炒

枳實

同麩皮炒

半夏

滾湯洗六七次全骨淨姜汁制

南星

判法与半夏同

前胡

去芦去土用甜竹漚潤晒乾味甘氣香是真胡味粗酸是野葛根誤食令人反胃不受食

柴胡

形長較皮赤黃有鬚勿見火似竹葉勿用

葛根

去皮切片取末白者佳

升麻

形輕堅實青綠色者佳去腐爛黑皮用

薄桂

凡用刮去粗皮形佳去腐爛黑皮用

麻黃

青色陳久者良凡用煎一二沸掠去沫則不令人煩

肉桂

凡用刮去粗皮形厚味濃各肉佳

玄胡索

形如半夏色黃如麩丸用鹽水拌炒

紫蘇

葉空紅者佳

蘇子

色紅者佳研入藥

胡蘆巴

即是番蘿蔔子春生苗夏結子

補骨脂

即破故布酒浸洗蒸半日晒乾入藥

骨碎補一名使孫姜

狗脊一名金毛狗脊去

兔絲子酒伴蒸焦作爛

胡麻三角胡麻

大麻子入土者損人用布包滾湯浸之冷取出垂井

肉苁蓉酒浸胡去浮田勞

金櫻子有刺搗汁去

牛膝形長大柔潤者

鎖陽即蓂蓉根酒浸洗

訶子肉用六稜者色黃帶黑

杜仲去皮鹽水

白芨川廣出

白薇形如葱

川烏炮

附子頂負方正重一兩或七八錢是附子

石斛洗蒸用

天雄即附子之長者麵

細辛

薄去不藥不言人須去頭上止山水浸一時

側子

是即附子旁出者如棗核大治風疹神妙木鱉子

續斷

酒蒸上斷皮皺者為真遠志用甘草湯煮一時

砂仁

去壳微炒

白豆蔻

去壳研碎

草豆蔻

去壳研碎

草果

去壳研碎

肉果

麵裹煨黃熟草

香附

用童便醋蒸

水薑

去皮熱薑皮

乾薑

生用性熱

川椒

陳去目及閉口

秦椒

閉口甘

華澄茄

酒伴

吳茱萸

用炭湯泡去苦汁

山茱萸

去核如不

大蒜

油裏煮

蘿蔔子研碎

山查去核

木瓜忌犯器

氏葵仁夫壳草蒂

地骨皮去骨洗

南五味去根炒

北五味去梗

薏苡仁去壳

石蓮子去壳

蓮葉蓮房蓮葉取蒂如銅錢大

鸛鵒去腸膜頂蒂蜜水伴炒用此藥急能

何首烏忌犯二種雜者赤色鴉白

蒲黃生用破血忌犯鐵器

菖蒲一寸九節者

艾州出香佳生用

荆芥陳久佳

香薷江西出佳

神麴陳久者佳

麥芽炒熟搗去壳

酒麴造者入藥

醋陳久者佳米造者入藥

淡豆豉出江西無鹽者佳

綠豆去壳入藥

葳靈仙去芦泥鉄脚者佳

防風新實脂潤者佳丫頭了尾勿用

羌活紫色節蜜者為羌活去土

獨活黃色作塊而氣香者活去土

天麻濕草帶包煨熟用

赤箭並似箭幹赤色花葉如箭羽其子以苦陳子五六凌中肉如麵定風草赤箭共一物根是天麻

苾薢川薢形休住大切開白帶粉販者多以荆蒿充賣形虫以其色紅味苦齒切開白色者是真

桑寄生性桑樹上住者佳
楓寄生其子及空葉不可食令候不吐並解之

淫羊藿洗去土得酒良
牛旁子結實者佳炒香微研

山牛即冷飯團又各土華薢漸廣出者其形負如胡荽大者佳忌犯鉄器鷄羊牛肉漆

新刊本

佛耳草

通食

蒼耳子

酒浸去風燒灰敷

益母草

有二種花白者入切火花紫者入藥忌
鐵器○莧薊子即益母草子多入眼科

草麻子

去壳

蔓荊子

微炒

白蒺藜

不入湯止入丸
微炒微研去刺

木賊草

川地者佳去即
水間品烘乾

密蒙花

背白色有細毛酒
拌陰乾蜜拌蒸

旋覆花

又名滴上金其
色黃

菊花

去青

款冬花

初花者佳

過東籐

不入丸散但
可煎湯熏洗

石楠葉

即丁公藤如桃
杞葉有刺紫點

芙蓉葉

其花同功為末入
敷藥不入湯丸

尤美葉

果尖長背白為末
入敷藥不入湯丸

白蘚皮

去骨用

白楊皮

菓貝如
大杏葉

紫荊皮

乃牛頭籐蔓生
者非用氏紫荊

牡荊皮

去心木洗
淨忌鉄器

桑白皮

細皮佳外面皮殺
人忌鐵器蜜伴炒

杏仁

湯泡去皮尖炒
黃色又仁不用

苑仁

湯泡去皮尖研
碎仁者不用

苑鳧

即對上小苑子自乾
不落中實者止片

郁李仁

去壳

柏子仁

入藥

蘇木

炒黑

乾漆

炒令烟尽入藥
子蟹化為水忌油

京三稜

味苦色黃体重形如小鰐
得真者生時畧亦人口舌乃是真二稜

阿魏

凡用去枯者鉢中研細
得真者研五六分安在熱鍋

大黃

酒伴服乾不傷
酒伴服乾不傷

鬱金

尺十二葉為白藥之英其
赤色者乃是真也

雷丸

色白者佳赤黑者
以降神即此

蓬朮

花即香古人用鬱金
伴酒醋

巴豆

若欲急治為水穀道
包打去脂去殼

已豆

若欲急治為水穀道
包打去脂去殼

雷丸

色白者佳赤黑者
以降神即此

巴豆

若欲急治為水穀道
包打去脂去殼

雷丸

色白者佳赤黑者
以降神即此

巴豆

若欲急治為水穀道
包打去脂去殼

雷丸

色白者佳赤黑者
以降神即此

烟盡色黃微黑則其性不甚暖

大腹皮

先用酒洗後

大腹子

尖長小者名換即大而區者多變子

棋柳

形如蕩心尖長心

皂莢

有子有數種有長尺餘者有如一指牙短小者良去皮

牽牛

有黑有白二種每斤

商陸

又名樟柳形類人花

秦艽

錦紋者佳

防己

去皮用紋如

澤瀉

去毛土用油

車前子

炒研

昆布

形如卷麻水洗去沙

海藻

水洗沙土用黑

芫花

黃精

用鉤吻能發人

甘遂

去莖用甘草水浸二日待水如墨汁澆出

大戟

凡用勿用附生者誤服令洩氣不禁即煎薤白子湯解之採來切片海羊藻伴蒸一時曬乾

巴戟

根先夫上夫心酒伴

菱荭

藥似黃精即黃精也

雞仁

去壳久有縷系

女姜

凡用根不用葉非

冬瓜

霜降後皮上白如粉

冬瓜

二去壳

茄子

能炭燒

芸薹菜

引氣生腹中

橘子

仁研用

酸棗仁

去壳

大棗

則令人煩

烏梅

安重安玉散中

白梅

去核

椿白皮

有花木中靈石

石榴皮

忌飲品藥水浸一

梨木皮

為末入敷藥

梨實

後食成冷痢產

川棟子

酒伴蒸熟剝去皮取肉去核只單用其核

或酒煮之

五十二

棟根白皮

根白有子者入藥根未無子者令人坐瀉不止有至死者

柿乾

即柿餅青

枇杷葉

火炙去毛成嗽不止

椰子

即黃東茄瓢

大小茴香

小茴香不必炒用大

青蒿

即蒿草根苗子葉皆可入藥以童便浸凡用反致病

石常

微炒去毛否則射肺令寒不治

地榆

洗去

百合

有紅白二種藥細花紅者不入藥

百部

其根數相連似天門冬而小炙酒洗佳紫苑去芦蜜水伴

松香

不用黃白者佳黑色者佳

零陵香

清伴

沉香

色黑者佳

丁香

謂丁香形小力少

乳香

妙用藥油

沒藥

色黑妙出油用之

蘇合香

天竺出此香是諸香汁煎成非一務也惟堅實芬芳如石燒之灰白者佳

安息香

似松脂黃黑色

血竭

真者味甘鹹似旆子氣爵不關如蠟者佳

冰片

粗壯瑩白大片如梅片如梅

蛇牀子

去皮壳取仁微沙如煎湯洗病生用

木香

形如枯骨苦口粘牙斤入藥不見火形類犀涯但筆涯大苦不入藥又與番白芷形相以能殺

人番白芷成片似魚皮有黠起如包釘然

牛李子

實似五味子色皆黑味苦居牛九衣

馬兜苓

即青木香生園中久為震虛軟狀如狗肺萍之紫塵噴出用敷諸瘡良

木鱉子

其形似鱉故以為名

鶴虱

數患者殺虫鮮此毒蜜湯下虫心痛肉汁下

狼毒

形似商陸而沉水者佳

木蘭

即其氣香美也

羊躑躅

取根刮去粘泥薄皮取肉皮醋伴炒伏地出火毒入草量大人小兒用不可多那能殺人

羊蹄根

即秃菜根以酒伴少

蕪荑

藥員厚如榆差小

藥品

註

馬鞭草 俗呼為欽掃帚苗以狼牙又數

辛夷 去心及皮其毛其毛射肺令嗽

蘆薈 即波斯國木脂 藜芦 微炒

草龍膽 去芦泥 紫葳花 生簾蔓依大木至

夜合花 似梧枝柔弱無葉而繁其葉兩上相向至暮

剪金花 花紅白色子似松子如黍粟其葉大如

黃蜀葵子 研入藥 雞冠花 宜用白者

青箱子 即野雞冠子花紫 槐花 去梗

槐實 以銅鏈打碎 槐枝 春末嫩枝燒存性

側柏葉 伴一服食酒

卷柏 生用破血

茅根

即茅筍也

白茅

即茅花也

仙茅

忌鐵器牛肉凡用米泔浸去赤汁出毒其葉青如茅而軟稍闊面有紋理又以棕間至冬結春

常山

形如雞骨者佳

葶藶

酒炒

荆瀝

取大竹燒之兩頭以瓦盛瀝汁

竹瀝

用箬竹或苗截一尺許盛置竹青取皮炒用

苦竹

竹淡竹葉竹大之葉為上苦

竺黃

出天竺國白其葉如耳黑色者

華木皮

山木以

棕皮

性燒用

沒石子

出西番有

夏枯草

有單白二種

鐵精捷法

莨菪子

即浪蕩子多食令人見鬼發狂魚用童便煮三日夜尚出苗其毒可知特載其異耳

旱蓮草

花細白子若小連房苗似旋復其苗實皆有十出須臾黑可染鬚

敗醬

即苦芹菜陳久生甘草水泮過二時

金星草

生石上者佳殺頭黃陀毒

剪草

生葵州者佳紅家乙蒸治一切失血

蘆柴根

土中取出者佳平上上者勿用

浮萍

採取曬乾為末用

山慈姑

即金灯花得蠟同用佳

射干

陰乾出土用其花黃者是

鬼臼

有毒不湯洗

芭蕉

根可生用不入群方搗汁金遊風上瘡

芭蕉油

取油法用竹筒削大刺入皮中受油

屋遊

即屋上青苔入藥煮服之

垣衣

即古牆垣上苔在井為之井苔

胡桐淚

黃色得水便化腹滿水調服取坐佳

伏龍肝

即電心凡也

白石灰

治金瘡得非良不藥貼骨疽積聚

陳壁土

東坡朝日者佳

無名異血生大食國磨滴雞雌黃不入湯藥

礪砂凡用飛澄去上石入磁器中重湯煮極熟入

雄黃透明者佳人不佩之辟邪解山川

鉄粉即鉄硃黃以砂鍋溶化傾入

輕粉即水銀升鍊成者黃丹炒令紫色研細用如

水銀用唾研如銅青煎膏用之

辰砂引出辰州者佳若用細研入藥須以磁石

赤銅屑出武昌打之不裂秤錘凡用燒紅

自然銅出信州鉛山縣銀場銅坑中似馬尾勁色紫

移人火煨石燕凡用須去泥沙石

喘卒七火煨

珍珠過用魚孔者佳肉汁煮
瑪瑙色紅黃以之研木不

琥珀可以手摩熟琥珀入藥
膽礬出信州其形如鵝

白礬入藥有宜煨熟用者
玄明粉即朴硝煉成入藥

空青其出信州形如荔枝中
曾青形如黃連外黃土色而

鐘乳粉薄如鵝翎管碎之如爪
芒硝取外硝淋汁煎煉領

朴硝色青白佳黃色者
石膏色白如粉細白潤佳

滑石目如凝脂軟活佳
紫石英如水精紫色連

白石英大如指長二三寸
玄精石色青白如龜背佳

代赫石染甲不白有光佳
玄精石色青白如龜背佳

代赫石染甲不白有光佳
玄精石色青白如龜背佳

代赫石染甲不白有光佳
玄精石色青白如龜背佳

青礞石

合偏研細成

驚管石

色白形如鷺

代赭

用染指甲不汚皮上青

滑中紫如雞肝者佳

蛇黃石

形如彈丸外黃內

磁石

之能引針石也以綿裹

烏古瓦

取塔上年

信石

毒此百即砒霜也

寒水石

即鹽之精燒過用

水花

沫也

陽起石

飛用等盛以帛密覆上

石決明

用七九孔佳十孔不

井泉石

北石如土色形方員不

石決明

用去粗皮鹽水煮

花蒞石

出饒陽即住研細為粉

石決明

用否則令人淋

禹餘糧

火煨醋淬七次研細

石決明

中有黃細末如蒲黃無

禹餘糧

如火煨醋淬七次研細

石決明

中有黃細末如蒲黃無

塚井中水

味砂石者佳其石中之黃
入有試之毛直下者無毒
如回炭以下不

天靈蓋

斗者為水有毒也以其毒
死之人頂骨十字解者陽
人用陰七人用陽

天生柴

即傷兒骨此藥代

人牙齒

火煨

人脫

即手足指甲

經餘

即室女經水未

交餘

即男女交接

血餘

即髮用男子二十左右皆佳以苦

紫河車

即胎衣先水洗以針挑破青絲去其血

棍襠袴襠

即男女布褲凡用取當陰之處剪取

即人輩燒
存性為云

臘月截竹為筒去青皮兩頭留節畧開細孔入甘草在內仍將葉塞用石同縛投坑

即童子尿瀝用無病肥壯童子小便清淨者
佳多服令人血反虛無熱之人甚勿多服

破血即小便耗血成者不宜多服淋石者即人患石淋尿中出

桑封上蠶卽子也惟桑封上者入菜用二
三月散鹽水浸蒸之火桑用否則令人濕

紅泥固濟入小毒研末海螵蛸魚骨

白一名上龍用頭者佳

即負壳用
入藥炒用

形
洗去鱗鬣
守宮守宮即蜥蜴也凡取存其尾去頭
鱗鬣用男用雌蚘女用雄蚘

或灸或乾
為末入藥

即老根蔓間腊汁
取出輕粉收目

蜚蠊 一名土狗 自出者佳 凡入藥炒用

班猫 六足以米同炒 至米黃色去米不用 研

蠶 下佳 去系紫 妙用 取 蜈蚣 入藥

天仙子 即推糞黑壳 蛭 全蝎 形緊小者佳 去腹中

水蛭 即馬蝗 火灸經年得 海馬 大小如守宮 其形似

蜚育 蛭 腹中有血者 白蠟 即蜜

土蜂 即大蜂 凡用 在蜂房中取頭足

蜂蜜 凡煉蜜 必須火化 開以帛覆經宿

露蜂房 火炙 蟬脫 其殼 頭上有一角

蛇脫 但入膏藥 如入藥 烏蛇 酒浸去頭尾炙熟去

白花蛇

酒浸去頭尾皮骨去藥出勸州頭有角口有齒尾有甲身有鱗者真

龜板

佳 九用 過者名敗龜大者 酒亦可 鱉甲 七 九 陽者真

川山甲

性去火毒

刺蝟

佳 得酒

蝙蝠

燒存性為末大者佳 白者可服末白勿用

夜明沙

即蝙蝠糞也

白丁香

直生者為男丁香 生即无雀糞也

猪胆汁

与人糞同功

五靈脂

生用行血少用止 淘去沙石方可用

猪齒

作灰治小兒驚疾

猪腎

久食令人少子

猪齒

作灰治小兒驚疾

野猪黃

其黃在胆中治 金瘡止血生肌

犬肉

純黃黑為上

牛肉

自絕者 大毒

狗頭骨

治金瘡

黃牛角

止血治赤白帶 燒存性為末服

牡牛尿

治九竅出血

牛黃

今市多是終出在肝胆中員黃成塊者此是嫩黃功力薄○凡牛有黃者皮毛光澤眼如火

色時復鳴引又好照水浴水字群斤爭先善解

有力好王人飲取其黃將牛於夏口邊與飲牛上

晒之令其熱渴以水一盃放牛口邊與飲牛上

渴甚飲而不得又即吐黃出如影如日令一

人急以濕布蔽牛口鼻一人急捉其黃其牛見

取其黃即濕布時自跌死其黃如雞子黃大重者

芳而輕鬆生時色黃赤乾久外如烏金色此其

老黃也多產晉地黃赤乾久外如烏金色此其

牛膽臘月取胆入天南星末連胆

牛乳生食令人痢熱食令人乾勿多食

阿膠切開有紅粉炒成珠馬肉殺人不飲酒能

龍骨其白青白枯者皆用黑色不用

虎精凡用先浸羊血不用

虎脛骨真骨中無系起者

羚羊角

或燒存性調酒或列入湯元或磨服此角有

中深銳有掛痕者是真又云置耳邊聞之聲有

犀角

犀角尖佳又云惡桂菌出則揚易碎忌鹽芥磨服

上者為勝又一種角上有一白縷如線直上至

牯犀角

紋理細膩班白分明一名班

鹿茸

長四五寸者端如馬腦紅者良又要不破損未

有細虫入與為害用酥油塗上以炭火炙之

鹿角

膠切寸段煮

鹿角霜

麝香

凡用午日

灵猫莖

非家猫即狸類

兔肝

治目暗和

兔肉

多食損人陽女

諸元氣

之筆頭得良

諸畜血

諸玄筋

神鬼病門

有八名

古云譴責又曰中惡因名隱晦今直述其名神鬼病也凡犯譴責條病者自宜內省悔過遷善紀神鬼病者不須用藥或後俗或符呪治之如神氣不足鬼邪着而為病者宜靜養氣血為先隨經用藥為次

○鬼脉

六部無脉在寸口之上大指之下有脉動者名曰鬼脉

神鬼病

其症卒然心腹刺痛即發謔語狂亂欲死沉沉
然上謗罵露人事人起心已知其聲哭吟不欲
見人須後俗送鬼祟亡靈羹飯不必祀神或符
呪治之是正理也用硃砂書字法或葱刺法

譴責病

親戚

寡婦尼姑室女邪祟交感病

見婦人門

鬼箭病

忽然一點痛不可忍○用桃樹皮一片將裡面
溫處貼痛上取艾一團如胡桃大安在桃皮上

灸之頃臍痛止

鬼擊病

夢中被刺或杖打卒然吐血衄血下血甚者九竅出血○服升獨湯

鬼疰病

疰者住也

男婦氣血皆虛鬼邪相干留住身中為病名曰鬼疰病○服八毒赤丸

卒中惡氣

腹大而滿或吐血數升脉數細死浮緩生○用書字法葱刺法

中忤鬼氣

幕夜或登頂或野步或入空屋忽然眼見鬼物
或口鼻吸着惡氣其症轟然跌倒四肢冷兩手
拳口鼻出清血與尸厥相同但腹不鳴心脇俱
暖切勿移動即令人圍繞打鼓燒安息香或蘇
木候醒可移○服犀角散硃砂射香研各一分
犀角剉屑四錢共為細末每服二錢井華水調
服如無前件藥用葱刺法

犀角散

前

葱刺法

用葱心黃刺鼻孔中一山無血入內七八寸使
目中出血佳男刺左女刺右

吹鼻法

令病人仰卧已物塞兩耳將簾管納病人鼻中
使兩人吹氣入內塞口無令氣出半日病人醒
勿復吹

書字法

用硃砂書鬼字在舌上額上

菖蒲灌法

菖蒲根撓汁灌之立瘥尸厥并卒死脉尚動聽

其耳中如微語聲股間暖者是也以此法治之
八毒赤丸

雄黃研礬石研硃砂研牡丹皮附子炮藜蘆巴豆
各一蜈蚣一條右為細末煉蜜為丸如小豆大每
服五七丸至十丸冷水送下病不愈再服

升獨湯

升麻 獨活 續斷 地黃各五錢 官桂

錢右為細末每服二錢食前白滾湯送下一日
服三次

識病捷法第九卷